

[View this email in your browser](#)



BRUNMÅLA

HÄSTKLINIK

Sommar, vi har öppet!

Äntligen har sommaren kommit, mer hagvistelse för din häst och lite ledighet för dig.

Vi har skickat med lite bra information om sårskador!

**Hela teamet på Brunmåla önskar er en GLAD
midsommar!**

Telefonen är öppen kl 8-15 helgfria vardagar hela sommaren, du kan alltid boka online eller skicka mail övrig tid.

Plötsligt en dag händer det – hästen kommer in från hagen med ett sår! Vad gör du? Var sitter såret?

Lokalisera var såret sitter på hästen. Om det är nära en led, senskida eller ögat är involverat är det bra att så snart som möjligt kontakta veterinär. Lika så om det ser ut att gå in mot buken eller andra organ.

Benen är nog det vanligaste stället där hästar får sår och på stora delar av benen är det bara huden som skyddar skelettet, leder och senor.

På huvudet är det också nära in till skelettet och därtill kan ögon, luftvägar och mun vara involverade.

Vad gör man?

Många gånger ser skadan större ut än vad den är innan man börjat rengöra.

Vi har rent vatten i kranarna i Sverige och därför går det ofta bra att spola rent såret med ljummet vatten.

Gör en bedömning – hur djupt är såret? Blöder det? Behöver det bandageras?

Om såret blöder är det bra att sätta ett rent bandage för att hämma blödningen och för att skydda såret. Bandaget hindrar också att vävnaden runt såret svullnar upp.

Ta tempen på hästen – normaltemp för en häst är < 38,2 C.

Kontrollera om hästen är halt i skritt genom att gå en kort bit i stallgången.

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

veterinär undersöker hästen. I väntan på veterinären får hästen stå i sin box och såret skyddas med bandage.

Om hästen har feber eller är halt i skritt är det också lämpligt att en veterinär undersöker hästen.

Kommer du fram till att såret verkar vara ytligt som ett skrubbsår, inte ligger nära någon led eller kotsenskida och inga andra organ verkar vara drabbade kan du skydda såret med bandage och avvakta. Kontrollera hur hästen mår efter några timmar igen för att se så ingen försämring skett.

Sammanfattningsvis - Kontakta alltid veterinär:

Om såret sitter nära led/senskida/senor

Om såret är djupt

Om sår går in mot bröst/bukhålan eller involverar andra organ

Ögat är skadat

Om mun eller tänder är skadade

Om hästen har feber

[Boka din veterinärtid, email](#)

[Boka din veterinärtid, online](#)

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼[Bra att ha i](#)**stallapoteket:**

Termometer

Sax

Ficklampa

Silvertejp

Engångshandskar

Brems

Bomull/Gamgee

Kompresser

NaCl/ögonskölj

Gasbindor (oelastiska)

Vetflex

Snögg (hästplåster)

Tvål (Lactacyd och

Hibiscrub)

Sårspruta

Jodopax

Vitt Vaseline



Copyright (C) 2024 Brunmåla AB. All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe](#)